Andermatt Biogarten

Gebrauchsanleitung

Tricho-C

Tricho-C sind Kärtchen belegt mit Eiern der Schlupfwespe Trichogramma cacoeciae zur Bekämpfung des Pflaumenwicklers. Kurz nach dem Schlüpfen legt die Schlupfwespe ihre Eier in die Eier des Pflaumenwicklers (Grapholita funebrana) ab. Die parasitierten Eier werden so zerstört.

Anwendung bei Zwetschgen und Pflaumen

Einzelbäume: 3 Freilassungen, jeweils 3 Kärtchen/Baum

Dosierung im Hausgarten:
Die erste Freilassung erfolgt kurz nach Flugbeginn der zweiten Generation des Pflaumenwicklers. Es folgen zwei weitere Freilassungen im Abstand von je 10 - 14 Tagen. Wir senden Ihnen die Nützlinge in 3 Lieferungen zum idealen Zeitpunkt zu. Die Kärtchen innerhalb der Krone aufhängen.

Freilassung möglichst rasch nach Erhalt machen!
Ist dies nicht möglich, kann Tricho-C an einem kühlen (7-10 °C) und dunklen Ort (z.B. Keller) während höchstens 1-2Tagen gelagert werden. Verpackung erst auf dem Feld öffnen, um eventuell schon geschlüpfte Trichogramma cacoeciae nicht zu verlieren.

Lebende Organismen (Insekten)
Formulierung: XE – Eier auf Kärtchen
Wirkstoff: *Trichogramma cacoeciae;* 3000 Eier/Karte
Eidg. Zulassungsnummer: W-6485
Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

Bewilligungsinhaber: Andermatt Biocontrol, 6146 Grossdietwil

Vorsicht:
Die Eier der Schlupfwespe sind empfindlich, insbesondere gegenüber Hitze und Sonneneinstrahlung. Tricho-C nicht an der Sonne stehen lassen. Bei sehr heißen Witterungsbedingungen Freilassungen am Abend oder früh am Morgen durchführen. Tricho-C nicht mit Pflanzenschutzmitteln lagern. Nach der ersten Freilassung, während der Aktivitätsperiode der Schlupfwespe möglichst keine
Pflanzenschutzmittel anwenden, die nicht nützlingsschonend sind. Trichogramma ertragen insbesondere keinen Schwefel.



1503

Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil, Tel. +41 (0)62 917 50 00, Fax +41 (0)62 917 50 01, www.biogarten.ch, info@biogarten.ch

Andermatt Biogarten

Mode d'emploi

Tricho-C

Tricho-C sont des petites cartes recouvertes d'oeufs de trichogrammes (guêpe parasitoïde) Trichogramma cacoeciae pour lutter contre le carpocapse des prunes (Grapholita funebrana). Après l'éclosion, les trichogrammes pondent leurs oeufs à l'intérieure des oeufs du carpocapse des prunes. Les oeufs ainsi parasités sont alors détruits.

Emploi à Prune et pruneau

Arbres isolés : 3 lâchers à 3 cartes/arbre

Effectuer le 1er lâcher après le début du vol de la 2ème génération du carpocapse des prunes. Effectuer les lâchers à 10-15 jours d'intervalle. **Nous allons vous envoyer les trois livraisons à intervalles de 14 jours.**
Accrocher les cartes à l'intérieure de la couronne.

Répartir les cartes dès que possible après leur réception! En cas d'empêchement, **Tricho-C** peut être conservé au frais (7-10 °C) et dans l'obscurité (ex cave) au maximum pendant 2 jours. Ouvrir l'emballage au champ afin de ne pas perdre les trichogrammes qui auraient déjà éclos.

Organismes vivants (insectes)
Formulation : XE – Oeufs sur cartes
Matière active : Trichogramma cacoeciae; 3000 oeufs/carte
Numéro de l'homologation: W-6485
Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Titulaire de l'autorisation: Andermatt Biocontrol, 6146 Grossdietwil

Précaution : Les oeufs des trichogrammes sont très sensibles, particulièrement à la chaleur et aux rayons du soleil. Ne pas exposer Tricho-C au soleil. Lors de conditions météo très chaudes, répartir Tricho-C le soir ou tôt le matin. Ne pas stocker Tricho-C avec des produits phytosanitaires. Après le 1er lâcher, pendant la période d'activité des trichogrammes, éviter dans la mesure du possible d'appliquer des produits phytosanitaires qui ne préservent pas les auxiliaires. Les trichogrammes ne tolèrent pas le soufre.



08/13

Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil, Tel. +41 (0)62 917 50 00, Fax +41 (0)62 917 50 01, www.biogarten.ch, info@biogarten.ch